



NAUJIENA



PAPILOCARE®

Makšties ir išorinių lytinių organų gelis



Išversta iš anglų kalbos

Jvairiaspalvės kempės pagrindu sukurtas gelis ŽPV
sukeltų išorinių lytinių organų karpoms gydyti: klinikinis atvejis¹

Dr. Luis Serrano.

HM Gabinete Velazquez poliklinika, Madridas, Ispanija



ŽPV sukeltos lytinių organų karpas

- Dažniausiai pasitaikanti klinikinė ŽPV apraiška¹
- Šią diagnozę bent kartą gyvenime išgirdo ~8 % vyrų ir moterų Europoje²⁻⁴
- Kiekvienais metais Ispanijoje tarp vyrų ir moterų atitinkamai užfiksuojama 31 000 ir 22 000 naujų atvejų⁵

Kodėl derėtų gydyti?

1

Pašalina simptomus:

- Nepatogumo jausmą, skausmą, kraujavimą ar niežulį.
- Psichologinius ir psichoseksualinius simptomus, pavyzdžiui, gėdijimąsi, nervingumą, seksualinės funkcijos sutrikimą ar žemą savivertę⁶.

2

Apsaugo partnerius:

- Seksualinis kontaktas yra pagrindinis perdavimo būdas.
- Ypač lengva užsikrėsti – karpų perdavimo sparta yra maždaug 65 %⁷.

3

Užkerta kelią papildomoms karpoms ir jų atsinaujinimui:

- Negydant, karpų daugėja arba jos tampa didesnės.
- Net ir po cheminio uždegimo ar lazerinio gydymo išlieka didelė atsinaujinimo tikimybė (nuo 30 iki 70 %)⁸.

Nepaisant to, kad liga yra labai dažna – gydymas yra gana skausmingas, ilgas, su nepastoviu rezultatyvumu, recidyvo tikimybe⁹

NAUJIENA



PAPILOCARE®

Makšties ir išorinių lytinių organų gelis

Vienintelė natūralių ingredientų kombinacija su įrodytu 70 % efektyvumu gydant ŽPV sukeltus gimdos kaklelio pažeidimus¹⁰ ir su 56 % viruso sunaikinimu¹¹, be citotoksinių efektų*.

Jau prieinamas papildomam lytinių organų karpų gydymui.




Speciali technologija maksimaliam prieinamumui ir poveikiui tikslinėms ląstelėms.


Papildomas ŽPV sukeltų lytinių organų karpų gydymas, skirtas vyrams ir moterims

Unikali sudėtis, pasižyminti visapusišku veikimu

NIOSOMOS




HIALURONO RŪGŠTIS
Drėkina



B-GLIUKANAI
Priešuždegiminis poveikis
Antioksidacinis poveikis

FITOSOMOS



AZIJINĖ CENTELĖ
(*Centella asiatica*)
Atkuria
Gydo

IVAIRIASPALVĖ KEMPĖ
(*Coriolus versicolor*)



NIMBAMEDIS
(*Azadirachta indica*)
Reepitelizuoja



BIOECOLIA®
Selektyviai moduliuoja
mikrobiotą



TIKRASIS ALAVIJAS
(*Aloe vera*)
Reepitelizuoja



IŠORINIŲ LYTINIŲ ORGANŲ GELIS SU ĮVAIRIASPALVE KEMPE, SKIRTAS GYDYTI ŽPV SUKELTAS LYTINIŲ ORGANŲ KARPAS. ATVEJO ANALIZĖ.

Autorius:
Luis Serrano. HM Gabinete Velazquez poliklinika, Madridas

Išversta iš anglų kalbos

IŽANGA

Įvairiaspalvės kempės pagrindu sukurtas makšties gelis yra prieinamas jau daugelyje Europos valstybių. Jis skiriamas siekiant užkirsti kelią ir papildomai gydyti ŽPV sukeltus gimdos kaklelio pažeidimus (*Papilocare*). Gelis išorinių lyties organų gydymui neseniai buvo pristatytas į rinką kaip papildoma ŽPV sukeltų lytinių organų išaugų gydymo priemonė.

KLINIKINIO ATVEJO APRAŠYMAS

25-erių pacientė apsilankė gimdos kaklelio patologijų tyrimų kabinete dėl dviejų šiek tiek išsikišusių išaugų. Pacientė neturi susijusios ligos istorijos, negimdžiusi. Išaugos išsidėsčiusios abipus vidurio linijos: tarp makšties prieangio ir išangės, ties 4 ir 8 valandomis, su vidutine pigmentacija ir plokštumu. Atlikta biopsija patvirtino ŽPV sukeltą lytinių organų karpą (1 paveikslėlis*).

Pradėtas gydymas 5 % imikvimodo kremu – po 4 gydymo savaitių nepastebėta jokių pokyčių, todėl buvo pradėtas taikyti kitas gydymas *Podophyllotoxin* 1,5 mg/g kremu. Atlikus pakartotinį vertinimą po 4 savaitių būklė išliko nepakitusi.


Dėl to buvo priimtas sprendimas palatoje taikyti gydymą CO2 lazeriu, pasitelkiant vietinę nejautrą, kai naudojami lidokaino ir prilokaino kremai ant viršutinės kairiosios išaugos dalies, siekiant įvertinti išaugos vystymąsi. Norint palengvinti pasekmes po lazerio procedūros, buvo paskirtas *Papilocare* gelis kas dvylika valandų, o pacientės buvo paprašyta atvykti po trijų savaitių, kad gijimo raida galėtų būti tinkamai įvertinta, o gydymas užbaigtas.

Pastebėta, kad proceso raida buvo puiki – kairioji išauga praktiškai išnykusi, nepaisant to, kad tik viršutinėje dalyje buvo taikoma lazerio procedūra. Įvertinus išaugą dešinėje pusėje pastebėta, kad nebėra kietų apnašų – tik įprasta karpas ketera ant normalios būklės odos (2 paveikslėlis*). Galiausiai lazerio procedūra buvo pritaikyta egzofitiniais pažeidimams, po to išaugos visiškai išnyko, o pacientei patvirtintas išgijimas (3 paveikslėlis*).


*Nuotraukos retušuotos.



1 paveikslėlis



2 paveikslėlis



3 paveikslėlis


APTARIMAS IR IŠVADOS

Pažymėtina, kad po nesėkmingo kietos, plokščios, pigmentuotos karpas gydymo imikvimodu ir podofilotksinu, ketvirtadaliui karpas taikius gydymą CO2 lazeriu ir visai karpai gydymą *Papilocare* geliu, ne tik chirurginio nudeginimo gijimo raida buvo pozityvi, bet sumažėjo ir neuždegintos karpas. Apnašinga išauga visai išnyko, liko tik įprastos karpas, tarpusavy atskirtos odos sluoksniu, kuris vėl tapo normalios būklės. Atsižvelgus į tokį teigiamą rezultatą, siekiant panaikinti lyties organų karpas yra pageidautinas tolesnis *Papilocare* gelio naudojimas: kaip vienintelė gydymo forma arba kaip papildinys įprastinėms gydymo formoms, pavyzdžiui, CO2 lazeriui.

NAUJIENA

PAPILOCARE®

Makšties ir išorinių lytinių organų gelis



Išversta iš anglų kalbos

Papildoma ŽPV sukeltų lytinių organų karpų gydymo priemonė, skirta vyrams ir moterims

PATENTUOTA
NOVATORIŠKA
FORMULĖ

Be citotoksiškumo*

Natūralios sudedamosios dalys



Skirtas išorinių lytinių organų gydymui:

- Padeda pašalinti karpas ir užkirsti kelią joms atsirasti.
- Atkuria audinius po medicininio / chirurginio gydymo.
- Drėkina ir atkuria epitelinius audinius.
- Tausoja sveiką odą.
- Veiksmingas ir saugus*.



NAUDOTI 2 KARTUS PER
DIENĄ IKI VISIŠKO IŠGIJIMO
ARBA GYDYTOJO APŽIŪROS

¹ Anic GM, Giuliano AR. Lytinių organų ŽPV infekcijos ir kiti susiję vyru pažeidimai. Prev Med 2011;53 Suppl 1: S36-S41

² Dinh TH, Sternberg M, Dunne EF, Markowitz LE. Lytinių organų karpas tarp 18–59 metų žmonių Jungtinėse Valstijose, nacionalinis sveikatos ir mitybos tyrimas, 1999–2004. Lytiškai plintančios ligos 2008;35: 357-60

³ Hartwig S, Syrjänen S, Dominkak-Tsiftoglou G, Brotons M, Castellsague X. Vėžio ir neoplazmų lygį, susijusių su žmogaus papilomos virusu, epidemiologinės naštios įvertinimas tarp europiečių vyrų: apžvalga. BMC Cancer 2012; 12:30

⁴ Kjaer SK, Tran TN, Sparen P, Tyggvadottir L, Munk C, Dasbach E, Liaw KL, Nygard M, Sunkumai, kuriuos sukelia lytinių organų karpas: beveik 7000 moterų iš bendros keturių Šiaurės šalių populiacijos tyrimas. J Infect Dis 2007; 196:1447-54.

⁵ Lopez N, Torne A, Franco A, San Martin M, Vianya E, Barull C, Penulero N. Epidemiologiniai ir ekonominiai sunkumai, kuriuos sukelia ŽPV liga Ispanijoje: penkių papildomų tipų pasekmės dėl 9-valentės vakcinos. Infectious Agents and Cancer 2018; 13:15.

⁶ Maw RD, Retano M, Roy M. Tarptautinė pacientų su lytinių organų karpomis apklausa: požūris į gydymą ir įkaka gyvenimo būdai. Int J STD AIDS 1998 Spalis; 9(10): 571-8

⁷ Fairley CK, Donovan B. Ką mums gali atskleisti genitalinių karpų stebėjimas? Sex Health; 2010; 7:325-327. Doi: 10.1071/SH09145

⁸ Kirby P, Dunne A, King DH, Corey L. Dvigubai aklas atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas: pačio suleidžiamas podofiloksinas prieš mašininių genitalinių karpų gydymą. Am J Med. 1990 Gegužė; 88(5): 465-9.

⁹ Edwards L, Ferenczy A, Lawrence E, Baker D, ir kiti. Paties naudojamas 5% imikvimodo kremas nuo išorinių lytinių organų karpų. Arch Dermatol 1998; 134:25-30.

¹⁰ Serano L, Lopez AC, Gonzalez S, Palacio S, Dexeus D, Centeno C, Coronado P, de la Fuente J, Fernandez JAL, Varnell C, Cortes J. Irvaitaspaivės kempės pagrindo gėlio naudingumas gydant gimdos kaklelio gleivinę su ŽPV sukeltu žaizdingumu. Tarpinės analizės rezultatai. J Low Genit Tract Dis 2018. 22(2S): S13-S14.

¹¹ Serano L, Lopez AC, Gonzalez S, Palacio S, Dexeus D, Centeno C, Coronado P, de la Fuente J, Fernandez JAL, Varnell C, Cortes J. Irvaitaspaivės kempės pagrindo gėlio naudingumas gydant ŽPV pažeistą gimdos kaklelio gleivinę. Tarpinės analizės rezultatai. J Low Genit Tract Dis 2018. 22(2S):S14.

* Informacija iš Procure Health SL 2018